

農業用資材 清掃・洗浄剤

育苗箱・ポット、
温室用資材、農具などの
効果的な洗浄に。



イソシアヌール酸系
速溶性顆粒

ハイスター®AG



イソシアヌール酸系
速溶性顆粒

ハイスター®AG

投入後直ちに溶解し、効果を発揮します。

少ない塩素臭。

長期間保存できます。

取り扱いが簡単です。



有効成分：ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム

包装仕様：10kg段ボール箱入

(2.5kgポリ容器(専用カップ付(1杯約30g))×4缶)

使用方法

場所	水10ℓ当たりの薬量	使用方法
稲育苗箱、育苗ポット、果実類貯蔵箱、支柱、ビニールハウス、温室用資材、農具等の洗浄	10～15g	10分間浸漬
上記のプラスチック類の資材	20～25g	ジョロ散布
保温むしろの洗浄(箱育苗用)	2～3g	ジョロ散布
ロックウール、礫の洗浄	10～15g	一晚浸漬

●ロックウール等への使用後は、流水にて充分に水洗して下さい。

●排水時は残留塩素を中和して放流して下さい。

保管及び取扱上の注意

※**混合禁止**：他の容器への詰め替えを避けて下さい。他の物質、特に無機系塩素剤(南海クリヤー、クリヤー、ハイクロン、トヨクロン、ケミクロン G、高度さらし粉、次亜塩素酸ソーダ液等)と混合させると爆発のおそれがあります。

※**高温吸湿**：吸湿しないように密閉し、冷暗所に貯蔵して下さい。雨漏り等でぬらさぬ様、又高温を発する所(ボイラー室、ブローア室、機械室、及びストーブ、モーターの側等)に絶対に置かないで下さい。急速な分解又は爆発のおそれがありますので充分注意して下さい。

※**子供注意**：子供の手の届かない所に保管して下さい。本剤に触れたり、遊んだり絶対にさせないで下さい。

腐食性：本剤は金属を錆びさせますので、陶器、プラスチック、ホーロー、ガラス製のきれいな容器を用いて下さい。

廃棄時：汚れた本剤はもとの容器に入れずに全量使い切って下さい。残量を廃棄するときは必ず多量の水に溶かしてチオ硫酸ナトリウム等で中和してから捨てて下さい。又、他の塩素剤と混ぜて絶対に捨てないで下さい。

火災注意：ゴミ箱やゴミ捨て場に絶対に捨てないで下さい。火災の原因となります。火災が発生した場合は、現場から遠ざけて類焼を避けて下さい。消火の場合は多量の水をかけて下さい。

散布注意：散布時は、人へ飛散しない様に注意して下さい。

換気注意：使用する場合は充分に換気をして下さい。使用中に目にしみたり、気分が悪くなった時は、直ちに離れ洗顔し、新鮮な空気のある場所へ移動し、使用を中止して下さい。

衣服付着：衣服についた時は、直ちに払い落とし、あとで充分水洗いして下さい。

輸送時：他の物質、特に無機系塩素剤(南海クリヤー、クリヤー、ハイクロン、トヨクロン、ケミクロン G、高度さらし粉、次亜塩素酸ソーダ液等)とは混載しないで下さい。移動、保管の際は、包装容器が破裂するような荷積みや強い衝撃を与えるような粗暴な取扱をしないで下さい。また他の容器への詰め替えをしないで下さい。又、配送中、乱袋等で本剤が露出した場合は、他の物質との接触を避け、乾いたプラスチックの容器に保管し、弊社までご連絡下さい。

代理店

Nankai 南海化学株式会社

本社 / 〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目12番19号
TEL.06-6532-5593

製造所・土佐工場 / 〒780-8010 高知市棧橋通4丁目10番1号
TEL.088-831-6191

<http://www.nankai-chem.co.jp/>